

昆蟲咬傷或刺傷

★蜜蜂

- *一般急救方法並非都很有效，因為傷口都深入皮膚。
- *被蜜蜂或黃蜂刺傷，可立刻用冰塊或冰水冷敷，以減輕疼痛，並可降低酸液的吸收速度。
- *若針刺留在皮膚上，不可用夾子夾，應該用消毒的針或小刀挑出針刺，患處塗上氨水，嚴重者立刻送醫。
- *身上若有 10 個咬傷處，要立即送醫。
- *有些人對於蜜蜂、黃蜂之毒液會引起強烈的過敏反應，應該請教醫生給與抗過敏藥物。

★蠍類

- *蠍有八隻足，頭頂有一對與蟹很相似的附屬物，一個能伸縮的軀體，和一條細長、分節的尾巴。
- *它的尾巴能捲曲，針刺位於尾巴末端。成蟲的針刺長約 11 公分以上。
- *蠍大都生活於陰涼、潮濕的房子、磚瓦、木料堆、及寬大的堤防下，而不喜歡活在陽光下。
- *有許多蠍在刺人時並不分泌毒素，因此沒有多大影響。被刺後，一般結果為局腫脹和變色，如黃蜂刺後的疼痛，持續半小時或一小時以上，有時則有過敏反應。
- *被毒蠍刺傷後，很少腫脹和變色，但刺傷部位卻有激烈的刺痛或灼痛的感覺。
- *成人隨後有不適的反應。嬰兒、兒童、老年人及身體衰弱的人，甚至會死亡。
- *此種蠍的毒液主要是破壞神經系統。

☆急救☆

- 1.手指或腳趾被刺傷，立刻在基部用帶子紮緊。
如受傷部位更高，則用更寬的帶子在近心處紮住。每五分鐘鬆一次帶子。
- 2.冷敷受傷部位兩小時，受傷部位須低於其他部位。
- 3.病人衣著必須足夠，使有舒適感。
- 4.送醫治療，設法減輕疼痛並預防感染。